

# Буклет

для воспитателей  
и родителей

**Как оказать ребенку первую  
помощь при укусе насекомого**



## ПРИ УКУСЕ ПЧЕЛЫ, ОСЫ, ШЕРШНЯ, ШМЕЛЯ



Главная опасность – развитие анафилактического шока.

**Симптомы:** резкая боль, зуд, жжение, краснота, отек.

### **Первая помощь**

1. Осмотрите место укуса. Если в ранке осталось жало, аккуратно вытащите его пинцетом.
2. Промойте место укуса холодной водой, приложите холод.
3. Успокойте ребенка, напоите водой или теплым чаем, при необходимости дайте обезболивающее средство.
4. Дайте антигистаминный препарат в возрастной дозе, если ребенок-аллергик или место укуса быстро, сильно отекает.
5. Следить за состоянием ребенка не менее чем полчаса после укуса.

### **Вызвать скорую помощь:**

- при множественных укусах;
- выраженной аллергической реакции;
- ухудшении самочувствия даже после единичного укуса;
- укусах в язык, гортань, полость рта.

## ПРИ УКУСЕ СЛЕПНЯ, КОМАРА, МОШКИ



Главная опасность – заражение туляремией, малярией, лихорадкой Западного Нила.

**Симптомы:** сильный зуд, покраснения кожи, боль.

### **Первая помощь**

1. Обработайте рану антисептиком, чтобы снять отечность, зуд.
2. Приложите холод при укусе слепня.
3. Помажьте место укуса антигистаминным гелем, чтобы уменьшить зуд.
4. Дайте антигистаминное средство внутрь, если отеки выраженные, а зуд сильный.

### **Вызвать скорую помощь:**

- насекомое застряло в ухе или под веком ребенка;
- появился отек, сильное раздражение, нагноение;
- развивается сильная аллергическая реакция: сыпь, затрудненность дыхания, тошнота, рвота, судороги.

## ПРИ УКУСЕ МУРАВЬЯ



Главная опасность – развитие анафилактического шока.

**Симптомы:** резкая боль, покраснение кожного покрова, припухлость, отеки, зуд, жжение кожи, тошнота, слабость, головокружение, зудящая пустула, которая заживает несколько дней или недель.

### **Первая помощь**

1. Осмотрите кожные покровы и одежду, стряхните муравьев.
2. Промойте место укуса водой в течение 10 минут.
3. Обработайте любым антисептическим средством и приложите холод.
4. Дайте большое количество простой воды и антигистаминный препарат детям-аллергикам.

### **Вызвать скорую помощь:**

- при множественных укусах;
- бледности кожи;
- сильной аллергической реакции;
- симптомах сердечной аритмии.