



Муниципальное казённое
учреждение
«Информационно-методический
центр» Козловского
муниципального округа
Чувашской Республики

429430, г. Козловка, ул. Ленина, 55
тел./факс: 8(83534)2-15-30
e-mail: kozlov_obrazov@cap.ru

от 07.02.2025 № 09
на № _____ от _____

Руководителям образовательных
учреждений Козловского
муниципального округа
Чувашской Республики

Муниципальное казённое учреждение «Информационно - методический центр» Козловского муниципального округа Чувашской Республики направляет письмо Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе от 05.02.2025 г. №21-10-00/23-123-2025 для размещения на официальных сайтах школ и детских садов Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Коклюш. Эпидемиологическая ситуация и меры профилактики».

Приложение: в 1 экз. на 3 л.

И.о. директора
МКУ «Информационно-методический центр»

Н.М. Шенчукова

Исп. Мишуткина М.И.
8(83534)21248
kozlov_metod4@cap.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ

Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Чувашской Республике - Чу-
вашии в Цивильском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Чувашской Республике -
Чувашии в Цивильском районе)
ул. Николаева, д. 4, г. Цивильск, Цивильский район,
Чувашская Республика, 429900
Тел./факс (83545) 2-13-30
E-mail: civilsk@21.rosпотребнадзор.ru

Главам администраций Цивильского,
Козловского, Красноармейского,
Урмарского, Мариинско - Посадского
муниципальных округов


05.02.2025 № 21-10.00/13-123-2025

На № _____ от _____

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе направляет информацию для размещения на сайтах администраций муниципальных округов, на официальные сайты школ и детских садов «Коклюш. Эпидемиологическая ситуация и меры профилактики».

Приложение в 1 экз. на 2 л.

Начальник
территориального отдела



М.И. Мустафин

Отдел образования и молодежной
политики администрации
Козловского муниципального округа
Чувашской Республики

Входящий № 231.
от « 02 » 02 20 25 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

« 05 » 02 20 25 г.
Вход № 763

Министр М.И.

09 - 04

Коклюш. Эпидемиологическая ситуация и меры профилактики.

В допрививочный период коклюшем ежегодно заболевало около 600 тысяч человек, а умирало около 5 тысяч. Несмотря на то, что массовая вакцинопрофилактика привела к снижению заболеваемости и смертности, коклюш все еще остается опасной инфекцией.

Показатель заболеваемости за 2024 г. превысил среднемноголетние показатели (СМП) в Чувашской Республике по коклюшу. За 2024 г. зарегистрировано 109 случаев заболевания коклюшем, показатель заболеваемости был ниже заболеваемости за 2023 год, но превысил среднемноголетние показатели (СМП).

Коклюш - очень заразная инфекция, характеризующаяся сильным кашлем, распространяющаяся среди людей всех возрастов, но особенно опасная для детей младшего возраста.

40% детей и подростков кашляют именно из-за коклюша. Также, коклюш является причиной хронического кашля у взрослых. Взрослые, являясь резервуаром инфекции, передают ее младенцам, не привитым или не достигшим возраста проведения вакцинации против этого заболевания, либо детям, не привитым по тем или иным причинам.

Заболеваемость у взрослых составляет около 25% случаев.

Первое описание этой болезни было дано французским врачом в 1538г.

Возбудитель бактерия *Bordetella pertussis*. Передаётся только от человека к человеку. Восприимчивость непривитого человека довольно высока (90%).

Источник инфекции - больной коклюшем взрослый или ребёнок.

Больные атипичными формами заболевания также могут распространять инфекцию несмотря на то, что клиническая картина может быть не ярко выражена.

Возбудитель коклюша распространяется между людьми воздушно-капельным путём довольно быстро.

Восприимчивость к коклюшу сохраняется высокой у детей до 1 года, у лиц, не привитых против коклюша, а также у тех, чей иммунитет к инфекции ослаб со временем.

Инкубационный период (скрытый) при коклюше длится от двух дней до двух, максимум трех недель.

Особенно заразны и опасны больные с 1 по 25 день заболевания. То есть риск заражения окружающих особенно велик в период катаральных явлений, а также в начале спазматического периода.

Коклюш у детей: для коклюша характерны длительный спазматический кашель, поражение дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. После того как прошел инкубационный период, у больного появляется насморк, чихание, общее недомогание, отсутствие аппетита, легкий кашель, который не уменьшается от противокашлевых средств. Этот период называется катаральный и длится он как обычная простуда 1-2 недели.

Постепенно к 3 неделе кашель усиливается, особенно в ночное время. Так начинается новый период лающего кашля. После глубокого свистящего вдоха следует серия коротких кашлевых толчков, напоминающих лай собаки.

Во время приступа кашля лицо больного краснеет или синеет, возможны носовые кровотечения или кровоизлияния в глаза. Кашель заканчивается выделением вязкой мокроты, иногда рвотой. В сутки таких приступов может быть 10-15 и больше. Этот период длится от недели до месяца, иногда дольше. Процесс выздоровления затягивается на несколько месяцев. Постепенно улучшаются сон и аппетит.

Осложнения коклюша наиболее часто наблюдаются у детей младше 1 года, с повышенным риском тяжелого течения у недоношенных младенцев.

Очень часто детям требуется госпитализация.

Чаще всего коклюш вызывает осложнения, связанные с развитием вторичной бактериальной инфекции: бактериальная, бронхит, плеврит, эмфизема, у детей раннего возраста коклюш может способствовать развитию бронхоэктатической болезни, синусит, отит, разрыв барабанных перепонки, кровотечение из носа и др.

Коклюш у взрослых проходит довольно тяжело и может стать причиной серьезных осложнений.

Симптомы коклюша у взрослых: общее недомогание и снижение аппетита. Незначительное увеличение температуры тела, которое сопровождается насморком и небольшим кашлем, симптомы начинают быстро усиливаться. Симптомы у взрослых напоминают симптомы бронхита, поэтому заболевание сразу выявить не очень просто. У некоторых болезнь проходит незаметно, что ведет к массовому инфицированию контактных лиц.

Коклюш и беременность.

Любое инфекционное заболевание во время беременности может негативно влиять на развитие плода и вызывать у него различные врожденные пороки, например, глухоту, катаракту, поражение сердца, скелета. Так же коклюш может провоцировать выкидыш и рождение мертвого ребенка.

Профилактика коклюша заключается во всеобщей вакцинации, проводимой согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Схема вакцинации детей

Вакцинация проводится в плановом порядке, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с 3 месяцев жизни трехкратно с интервалом в 1,5 месяца, то есть в 3 мес. - 4,5 мес. - 6 мес.

Ревакцинация проводится однократно в 18 мес.

Неспецифическая профилактика

Поскольку единственный путь передачи коклюша - воздушно-капельный, необходимо соблюдать правила гигиены:

прикрывать рот и нос салфеткой во время чихания и кашля, после чего ее выбросить (если нет салфетки - использовать свой локтевой сгиб),
гигиена рук.

Не отказывайтесь от возможности защитить своих детей от этой коварной инфекции!